

M A N U E L

D'HISTOIRE NATURELLE ,

TRADUIT DE L'ALLEMAND ,

De J. FR. BLUMENBACH, Professeur à l'Université
de Gottingue.

Par SOULANGE ARTAUD.

AVEC FIGURES.

Multa fiunt eadem, sed aliter.

QUINTILIAN.

T O M E P R E M I E R .



A M E T Z ,

CHEZ COLLIGNON, IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

A PARIS, {
Chez LEYRAULT frères, Quai Malaquais.
HENRICHS, rue de la Loi.
LÉNORMANT, rue des Prêtres - St. - Germain-
l'Auxerrois.

A N X I. — 1803.

lat. <i>M. amphibius.</i>	la moitié du corps ; oreilles sortant à peine ; pieds presque tétradactyles. SCHREBER. pl. 186.
all. die Wasserratte.	
angl. the Waterrat.	

Fait beaucoup de mal dans les jardins , particulièrement aux racines des plantes.

4. Le Campagnol.	Queue médiocre , dos ferrugineux , abdomen cendré. SCHREBER. pl. 191.
lat. <i>M. arvalis.</i>	
all. die Feldmaus.	
angl. the Fieldmouse.	

Se multiplie dans certaines années d'une manière prodigieuse , et fait un grand tort , particulièrement aux semailles d'automne.

5. La Souris.	Queue alongée ; pieds de devant tétradactyles ; pouces des pieds de derrière sans ongles.
lat. <i>M. musculus.</i>	
all. die Hausmaus.	
angl. the Mouse.	

En Europe , et dans les climats tempérés de l'Asie et de l'Amérique , elle est devenue malgré nous une espèce d'animal domestique.

Les souris blanches aux yeux rouges , sont des chacrelas dans leur genre ; souvent la lumière les blesse tellement , que dans le grand jour elles ferment les paupières , et on les croiroit aveugles.

6. Le Rat.	Queue alongée ; pieds de devant tétradactyles , avec un ongllet au pouce.
lat. <i>M. matus.</i>	
all. die Ratte.	
angl. the Rat.	

Est répandu à présent presque dans toutes les parties du monde, mais il paroît originaire de la partie moyenne de l'Europe. Cet animal est extrêmement vorace ; il mange même des scorpions ; il suit l'homme par-tout, et attaque ses comestibles. Les mineurs le trouvent dans leurs mines les plus profondes, et les navigateurs l'ont également pour compagnon de voyage sur leurs vaisseaux. Entre autres désastres dont il est cause ; ce fléau public et domestique ruine les plantations à sucre dans les Indes occidentales.

Le surmulot (*mus decumanus*, all. die *Wanderratte*, angl. *the brown Rat*) est d'une couleur plus claire, et son poil est mêlé de plusieurs soies longues et roides.

X. Les Marmottes (*Marmota*, *arctomys*).

(Oreilles externes écourtées, queue courte ou nulle, les dents (pour la plupart) comme dans les genres précédens).

1.	La Marmotte.	Corps brun en dessus, flavescent en dessous. SCHREBER. pl. 207.
lat.	<i>M. alpina</i> .	
all.	das Murmelthier (dans le pays des Grisons, Mürmont, du lat. <i>Mus montanus</i>).	
angl.	the Marmot.	

Vit sur les plus hautes Alpes de l'Europe et de l'Asie. Une chose assez singulière, dans l'*Allée blanche*, en Savoie, on trouve parfois cet animal sur des rochers isolés, qui semblent sortir comme des îles de cette mer de glace, sont éloignés de quelques lieues de toute terre, sans glaces, et pendant toute l'année sont sans neige seulement six semaines ; ainsi il paroît que les marmottes de ce pays dorment au moins dix mois de l'année, et ne passent, sans dormir, qu'une très-petite partie de leur vie.

2. Le Hamster.
lat. *M. cricetus*.
all. der Hamster.
angl. the Hamster.

Abdomen noir.
F. G. Sulzers, n.º 9,
des Hamsters. Gott. 1774,
8. taf. 1. 2.

Est fort commun en Allemagne, en Pologne, en Sibérie, etc.; il vit particulièrement de blé, de fèves, etc.; il en met une grande provision dans ses abajoues, et les porte dans ses souterrains, qui ont quelquefois sept pieds de profondeur. Un de ces trous peut contenir parfois soixante livres de pareilles provisions. Cet animal se multiplie extrêmement. Dans le pays de Gotha on en a tué en un an plus de vingt-sept mille.

On trouve parmi les hamsters une variété tout-à-fait noire ; il y a aussi des chacrelas avec des yeux couleur de rose.

3. Le Lemming. | Tête pointue, corps